

## Tardio 630

**Tamaño:** Medio y grande.

**Forma:** Asimétrica, redondeada y con prominencia en la sutura, zona ecuatorial, y depresión en uno de sus lados laterales cerca de la sutura, en su tercio superior.

**Zona pistilar:** Ligeramente desplazada hacia la cara ventral y también hacia uno de sus lados laterales. Vértice redondeado con mamelón muy pequeño y la base de éste con cubeta en todos sus lados siendo más marcada en las dos caras.

**Sutura:** Superficial, sólo marcada por una raya. Hendida en la cavidad peduncular y zona pistilar.

**Cavidad peduncular:** Estrecha y profunda.

**Piel:** Velloso, de pubescencia abundante, corta y anteada. **Color:** Domina el amarillo anaranjado del fondo. Chapa rojo grana apagado, de aspecto marmóreo o manchoso que no cubre más que un cuarto de la superficie del fruto, dejando entrever el fondo. A veces casi sin chapa presentando sólo pequeños toques de rojo muy suave.

**Carne:** Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso, aunque en ocasiones teñida de sonrosado muy suave. Jugosa, crujiente, agridulce y poco aromática. **Sabor:** No muy bueno.

**Hueso:** Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada, aplastado en sus lados laterales en su tercio inferior. Mucrón corto y afilado. Cresta ventral saliente, más en su mitad inferior. Surco dorsal ancho y de profundidad media, interrumpido una o dos veces por los surcos laterales. Superficie áspera, muy esculpida, con surcos estrechos, largos y curvados, siendo más largos y abundantes en su mitad superior. Polo peduncular abierto.

**Maduración:** Tercera decena de septiembre en Montilla del Palancar (Cuenca).

